AN 1 Änderungsmaße

1a. Änderungsmaße in einem Intervall

Sei f eine reelle Funktion, die auf dem Intervall $[a; b]$ definiert ist. Dann bezeichnet man

$- f(b)-f(a)$	als <u>absolute Änderung</u> von f in $[a; b]$.
$\frac{f(b)-f(a)}{f(a)}$	als <u>relative Änderung</u> von f in $[a; b]$.
$\frac{f(b)-f(a)}{f(a)} \cdot 100$	als <u>prozentuelle Änderung</u> (relative Änderung mal 100) von f in $[a; b]$.
$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$	als <u>mittlere Änderung</u> von f in $[a; b]$ = Differenzenquotient = Sekantensteigung k_{sek} Der Differenzenquotient einer linearen Funktion ist die Steigung der linearen Funktion. Sei s eine <u>Zeit-Ort Funktion</u> , dann entspricht der <u>Differenzenquotient</u> im Zeitintervall $[t_1; t_2]$: $\bar{v}(t_1; t_2) = \frac{s(t_2)-s(t_1)}{t_2-t_1}$ der <u>mittleren Geschwindigkeit</u> (Quotient aus Wegänderung und der dafür benötigten Zeit).

1b. Änderungsmaß an einer Stelle

Sei f eine reelle Funktion, dann heißt

$\lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z)-f(x)}{z-x} = f'(x)$ momentane (lokale) Änderungsrate von f an der Stelle x

= Differentialquotient = $\lim$ + Differenzenquotient =

= Differenzenquotient in einer sehr kleinen Umgebung von x =

= Tangentensteigung $k_{tan} = f'(x) = 1.$ Ableitung an d. Stelle x

Der Differentialquotient einer linearen Funktion ist die Steigung der linearen Funktion.

Sei s eine Zeit-Ort-Funktion, dann heißt $v(t) = s'(t) = \lim_{z \rightarrow t} \frac{s(z)-s(t)}{z-t}$

momentane Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t .

2. Verschiedene Schreibweisen

$$z-x=\Delta x$$

$$f(z)-f(x)=\Delta y=\Delta f$$

2a. Differenzenquotient

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

2b. Differentialquotient

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z)-f(x)}{z-x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{df}{dx} = \frac{dy}{dx}$$

Nähert sich beim Differentialquotient z unbegrenzt der Zahl x , so werden Δx und Δy immer kleiner. So erhält man „unendlich kleine Größen“, die Differentiale genannt werden und mit dx bzw. dy bezeichnet werden. Der Zahl, der sich der Quotient $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ dabei unbegrenzt nähert, wird mit $\frac{dy}{dx}$ bezeichnet („ dy nach dx “) und wird ebenfalls Differentialquotient genannt.

Graphische Darstellung:

3. Typische Anwendungen momentane Änderungsrate bzw. mittlere Änderungsrate

Bei positivem Vorzeichen spricht man von (mittleren) Zunahmeraten, bei negativem Vorzeichen von (mittleren) Abnahmeraten.

Geschwindigkeiten

- bezogen auf eine Ort-Zeit-Funktion (s.o.).
- Mittlere bzw. lokale Änderungsgeschwindigkeiten werden bei zeitabhängigen Größen verwendet, z.B. Wachstum einer Pflanze, Bakterienwachstum.

Beschleunigung

- mittlere Beschleunigung: Sei s eine Zeit-Geschwindigkeitsfunktion, dann entspricht der Differenzenquotient im Zeitintervall $[t_1; t_2]$: $\bar{a}(t_1; t_2) = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1}$ der mittleren Beschleunigung (Quotient aus Geschwindigkeitsänderung und der dafür benötigten Zeit).
- Momentane Beschleunigung: Sei s eine Zeit-Geschwindigkeitsfunktion, dann heißt $a(t) = v'(t) = s''(t) = \lim_{z \rightarrow t} \frac{v(z) - v(t)}{z - t}$ momentane Beschleunigung zum Zeitpunkt t .
- Anwendungen aus der Wirtschaft, z.B. Grenzkosten.
- Anwendungen aus den Naturwissenschaften, z. B. Luftdruckänderung.

4. Differentialquotient aus Funktionsgleichungen berechnen

Beispiele:

4a. Berechne die Ableitungsfunktion von f mit $f(x) = x^2$.

$$\lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{z^2 - x^2}{z - x} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{(z-x)(z+x)}{z-x} = \lim_{z \rightarrow x} z + x = x + x = 2x$$

4b. Berechne die Ableitungsfunktion von f mit $f(x) = x^2 - 2x$.

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} &= \lim_{z \rightarrow x} \frac{z^2 - 2z - (x^2 - 2x)}{z - x} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{z^2 - 2z - x^2 + 2x}{z - x} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{(z^2 - x^2) - 2z + 2x}{z - x} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{(z-x)(z+x) - 2z + 2x}{z - x} = \\ \lim_{z \rightarrow x} \frac{(z-x)(z+x) - 2(z-x)}{z - x} &= \lim_{z \rightarrow x} \frac{(z-x)[(z+x) - 2]}{z - x} = \lim_{z \rightarrow x} z + x - 2 = x + x - 2 = 2x - 2 \end{aligned}$$

5. Differenzgleichungen**5a. Lineares Wachsen und Abnehmen**

$P(n)$ sei eine Größe einer linear wachsenden Population zum Zeitpunkt n in Jahren.
Zu Beginn sei die Größe der Population gleich d . Pro Jahr wächst sie um k .

Also:

$$P(0)=d \qquad P(n+1)=P(n)+k$$

dies nennt man rekursive Darstellung eines linearen Wachstums.

Allgemein für beliebig gleich große Zeitabschnitte Δt :

$$P(t+\Delta t)=P(t)+k \cdot \Delta t \qquad P(t+\Delta t)-P(t)=k \cdot \Delta t$$

$$\Delta P=k \cdot \Delta t \qquad \text{mit} \qquad \Delta P=P(t+\Delta t)-P(t)$$

Beispiel zu 5a:

a. Ermittle $P(n)$ für $n=0, 1, 2, 3$ mit $d=1,5$ und $k=0,5$

b. Es gelte $P(0)=d$ und $P(t+\Delta t)=P(t)+k \cdot \Delta t$. Ermittle $P(n \cdot \Delta t)$ für $n=0, 1, 2, 3$ mit $d=1000$, $k=400$ und $\Delta t=2$

5b. Exponentielles Wachsen und Abnehmen

$P(n)$ sei eine Größe einer exponentiell wachsenden Population zum Zeitpunkt n in Jahren.
Zu Beginn sei die Größe der Population gleich c . Pro Jahr wächst sie mit dem Faktor $a > 1$.

Also: $P(0) = c$

$$P(n+1) = P(n) \cdot a$$

dies nennt man rekursive Darstellung eines exponentiellen Wachstums.

Allgemein gilt für beliebig gleich große Zeitabschnitte Δt :

$$P(0) = c$$

$$P(t + \Delta t) = P(t) \cdot a^{\Delta t}$$

Beispiel zu 5b:

a. Es gelte $P(0) = c$ und $P(n+1) = P(n) \cdot a$. Ermittle $P(n)$ für $n=0, 1, 2, 3$ mit $c=100$ und $a=1,1$

b. Es gelte $P(0) = c$ und $P(t + \Delta t) = P(t) \cdot a^{\Delta t}$. Ermittle $P(n \cdot \Delta t)$ für $n=0, 1, 2, 3$ mit $c=50$, $a=1,2$ und $\Delta t=5$.

AN 2 Regeln für das Differenzieren

Ableitungsregel für konstante Funktionen

$$f(x)=c \qquad f'(x)=0 \qquad (c \in \mathbb{R})$$

Bsp.:

$$f(x)=5 \qquad f'(x)=0$$

Regel vom konstanten Faktor

$$f(x)=c \cdot g(x) \qquad f'(x)=c \cdot g'(x) \qquad (c \in \mathbb{R})$$

Bsp.:

$$f(x)=2 \cdot x^2 \qquad f'(x)=2 \cdot 2x$$

Potenzregel

$$f(x)=x^n \qquad f'(x)=n \cdot x^{n-1}$$

Bsp.:

$$f(x)=x^2 \qquad f'(x)=2x$$

Summen bzw. Differenzenregel

$$f(x)=g(x) + h(x) \qquad f'(x)=g'(x) + h'(x)$$

$$f(x)=g(x) - h(x) \qquad f'(x)=g'(x) - h'(x)$$

Bsp.:

$$f(x)=4x^3 - 2x^2 + 3x \qquad f'(x)=12x^2 - 4x + 3$$

Produktregel

$$f(x)=g(x) \cdot h(x) \qquad f'(x)=g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$$

Bsp.:

$$f(x)=2x(2-x) \qquad f'(x)=2(2-x) + 2x(-1) = 4 - 4x$$

→ ausmultiplizieren auch möglich

Quotientenregel $\rightarrow$ NAZ-ZAN

$\rightarrow$ Nenner-Ableitung $\cdot$ Zähler - Zähler-Ableitung $\cdot$ Nenner

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

$$f'(x) = \frac{h(x) \cdot g'(x) - g(x) \cdot h'(x)}{h^2(x)}$$

Bsp.:

$$f(x) = \frac{3x+2}{2x-1}$$

$$f'(x) = \frac{(2x-1) \cdot 3 - (3x+2) \cdot 2}{(2x-1)^2} = \frac{-7}{(2x-1)^2}$$

Ableitungen Sinus und Cosinus

$$f(x) = \sin(x)$$

$$f'(x) = \cos(x)$$

$$f(x) = \cos(x)$$

$$f'(x) = -\sin(x)$$

Ableitung Exponentialfunktion

$$f(x) = e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

Ableitungsregeln für f(kx)

$$g(x) = f(kx)$$

$$g'(x) = k \cdot f'(kx)$$

Bsp.:

$$f(x) = \sin(2x)$$

$$f'(x) = 2 \cdot \cos(2x)$$

$$f(x) = e^{2x}$$

$$f'(x) = 2 \cdot e^{2x}$$

Ableitung der Quadratwurzel

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Kettenregel

$$f(x) = u(v(x))$$

$$f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$$

$u'(v(x)) \cdot$... äußere Ableitung

$v'(x)$... innere Ableitung

Merke: Kettenregel = äußere Ableitung mal innere Ableitung

Bsp.:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} = (x^2 - 2x)^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} (x^2 - 2x)^{-\frac{1}{2}} (2x - 2) = \frac{2x-2}{2\sqrt{(x^2-2x)}} = \frac{2(x-1)}{2\sqrt{\dots}}$$

Ableitung einer Logarithmusfunktion

$f(x) = \ln x$

$f'(x) = \frac{1}{x}$

Bsp.:

$f(x) = 3 \cdot \ln(x^2)$

$f'(x) = 3 \cdot \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{6}{x}$

Anwendung von mehreren Regeln

Bsp.:

$f(x) = e^{x^2} 4x^2$

$f'(x) = e^{x^2} 8x + e^{x^2} 2x \cdot 4x^2 = 8xe^{x^2} + 8x^3e^{x^2}$

Nach verschiedenen unabhängigen Variablen ableiten

Bsp.:

$s(a) = xa^2 - wa^3$

$s'(a) = 2xa - 3wa^2$

$f(x) = e^{x^2} 4x^2$

$f'(x) = e^{x^2} 8x + e^{x^2} 2x \cdot 4x^2 =$

$= 8xe^{x^2} + 8x^3e^{x^2} =$